

# Cesárea

Procedimiento quirúrgico mediante el cual el feto y los anexos ovulares son extraídos después de las 28 semanas de gestación a través de una incisión en el abdomen y en el útero.

Recomendación: Administración preoperatoria de AB profiláctico de espectro limitado (cefalosporina de 1ra generación)  
La administración adicional de azitromicina reduce aún más la endometritis y la infección de la herida quirúrgica.

## Absolutas




## Indicaciones



## Relativas

- Cesárea iterativa
- Presentación pélvica
- Sufrimiento fetal
- Retraso en el crecimiento intrauterino
- Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta
- Placenta previa
- Placenta de inserción baja
- Insición uterina corporal previa
- Presentación de cara
- Prolapso de cordón umbilical
- Hidrocefalia
- Gemelos unidos
- Infecciones maternas de transmisión vertical (VIH)
- Embarazo pretérmino (<1500 grs de peso fetal)
- Condilomas vulvares grandes



- Desproporción cefalopélvica
- Enfermedad hipertensiva del embarazo
- Ruptura prematura de membranas
- Embarazo postérmino
- Embarazo múltiple
- Distocia dinámica
- Isoinmunización materno-fetal
- Diabetes Mellitus
- Antecedente de:
  - Deciduo metritis
  - Metroplastia
  - Miomectomía
- Compromiso de histerorrafia
- Oligohidramnios
- Cirugía vaginal previa
- Primigesta añosa
- Miomatosis uterina
- Cesárea electiva